



照片由農委會提供

預防 狂犬病

認識狂犬病

- 傳染途徑：99%是經由動物抓咬傷所造成。已感染狂犬病的動物咬傷人，病毒藉由唾液進入傷口，破壞中樞神經系統。
- 潛伏期：約1-3個月，也可能是1週至7年。
- 症狀：初期症狀發熱、喉嚨痛等、咬傷處有異樣感；數天後，病患會出現興奮、恐懼、麻痺、吞嚥困難、咽喉部肌肉痙攣(恐水症)，隨後會發生精神錯亂及抽搐。

人用狂犬病疫苗接種對象

- 1 咬傷後「被咬傷後」預防接種，經醫師評估，符合建議接種者，一定打得到。需接種5劑疫苗，第0天、3天、7天、14天、28天。僅有傷口嚴重或大面積時，需由醫師評估增加使用免疫球蛋白1劑。
- 2 咬傷前「被咬傷前」預防接種。需接種3劑疫苗，第0天、7天、21或28天。依風險高低，由政府依序通知至指定地點接種。
 - 1 第一線動物防疫人員及捕犬人員
 - 2 動物收容所相關業務人員
 - 3 開業獸醫師

多警覺 ▲ 多安心

提高警覺 預防狂犬病

●如何預防被動物咬傷？

- 1 不碰觸野生動物
- 2 不撿拾生病的野生動物、屍體，遇疑似狂犬病動物時，可洽詢各地動物防疫機關或電洽0800-761-590

●被動物抓咬傷，請遵循「1記」、「2沖」、「3送」、「4觀」



到那裡就醫？

各縣市都有人用狂犬病疫苗儲備醫院
查詢醫院，請洽1922防疫專線

臨床醫師遇被動物抓咬傷的患者，除消毒及處置傷口、施打破傷風類毒素外，同時評估該動物特性、病患傷口嚴重性等，若需要施打人用狂犬病疫苗，請儘速轉至疫苗儲備醫院提出申請。

小心 狂犬病



郊遊時

不逗野生動物




遛寵物

不接觸
流浪野生動物



養寵物

犬貓定期打疫苗



抓咬傷時

儘速就醫
清洗消毒後，



1 記



保持冷靜，牢記動物特徵

2 沖



用大量肥皂、
清水沖洗15分鐘，
並以優碘消毒傷口

3 送



儘速送醫評估
是否要接種疫苗

4 觀



儘可能將咬人動物繫留
觀察10天

各縣市都有疫苗儲備醫院，請洽 **1922** 防疫專線！

相關影音教材

[愛護牠 也當心狂犬病 \(202107製\) – YouTube](#)

[預防狂犬病（防疫醫師說明篇） - YouTube](#)